

CHEMICAL COMPOSITION:	
Azadirachtin (a.i.) (min).	0.15 % W/W
Others	99.85% W/W
Total:	100.000 % W/W



DIRECTION OF USE

Please see the enclosed Leaflet.

PRECAUTIONS

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

ANTIDOTE

Treat symptomatically. Give gastric lavage if swallowed. Call a physician

FIRST AID

Please see the enclosed Leaflet.

SYMPTOMS

RECOMMENDATIONS

Azadirachtin 0.15% min. pest control agent used for the control of white fly and bollworm of cotton and thrips, stem borer, brown plant hopper and leaf folder on paddy

MANUFACTURED AND MARKETING BY :

SUNSHIV BOTANICS PRIVATE LIMITED

Plot No. 5E, Opp. Yamaha Plant, Industrial Area,
Mathura Road, Faridabad-121001, Haryana

1 Ltr.



Neem Seed Kernel Based EC Containing Azadirachtin- 0.15% EC (1500 ppm) min.

नीम बीज गुद्दा आधारित ई.सी. अजाडिरेक्टिन
0.15 प्रतिशत (1500 पी.पी.एम) न्यूनतम

AZASUN™
Azadirachtin-1500 PPM **0.15%**



बच्चों के पहुँच से दूर रखें।
Keep out of reach of children.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें
Keep in cool, dry place away from
heat and open flame.

CIR-199643/2022-Neem Seed Kernel Based EC
(Containing Azadirachtin) (437)-3241

GOVT. APPROVED

कीटनाशक

Insecticide

रासायनिक संरचना:

एजेडिरेक्टिन स.त.न्यूनतम	0.15% भार/भार
अन्य	99.85 % भार/भार
योग:	100,000% भार/भार

उपयोग के लिये निर्देश:

अधिक तेज दबाव के छिड़काव द्वारा, घोल और मात्रा के अनुसार प्रयोग करने से उपयोग में लिये गये कीटों की रोकथाम कर सकता है ।। इस पदार्थ की निधारित मात्रा को थोड़े पानी में मिलाकर अच्छी तरह हिलायें, फिर छिड़काव के घोल की मात्रा के मुताबिक बाकि का पानी डालें और अच्छी तरह हिलायें ताकि छिड़काव के लिये तैयार हो जाये ।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:

1. साँस से अन्दर न जाने दें, शरीर या मुँह न लगने दें ।
2. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
3. छिड़काव के समय भूग्नपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
4. छिड़काव करते या मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विषनाशक:

विष लक्षणानुसार इलाज करें। गैस्ट्रिक लावेंज दें। डाक्टर को बुलायें ।

प्राथमिक चिकित्सा:

कृपया संलग्न लीफलेट देखें।

लक्षण:

कृपया संलग्न लीफलेट देखें।

उपयोग:

इसका उपयोग टमाटर में लगने वाले फल छेदक एवं बैंगन में लगने वाला प्ररोह और छेदक के नियंत्रण के लिये होता है।

Regn. No.	CIR-199643/2022
Mfg. Lic. No.	_____
Batch No.	_____
Mfg Date	_____
Exp. Date	1 year from mfg. date
Net Content / Volume	1 Ltr
Max. Retail Price	